

Codice nido:

censimento nidi di IRUNDINIDI

Quota:

Coordinate satellitari:

Specie costruttrice-occupante:

Altezza del nido da terra:

Orientamento apertura:

Situazione di utilizzo-presenza e comportamento della specie all'intorno:

DATA:

Rilevatori:

Orario:

Condizioni meteorologiche:

**BALESTRUCCIO**  
(*Delichon urbica*) House Martin

Una rondine con una tipica macchia bianca sul groppone.

**Identificazione.** Lunghezza: 13 cm, più corto e tozzo della Rondine; apertura alare: fino a 29 cm. Occhi: marrone scuri. Becco: nero. Tarsi e piedi: ricoperti di piume bianche. Sessi: simili. **Periodo riproduttivo:** superiormente nero blauscuro (nero a distanza). Netta macchia bianca sul groppone. Inferiormente tutto bianco. Tessa raccolta. Coda forcuta (meno della Rondine) e corta. **Inverno:** parti veleggiato, frullante con planate più lunghe e normalmente a maggior altezza della Rondine senza le picchiate e le piroette di quest'ultima; meno impetuoso e battuto del Rondone. Il groppone bianco è diagnostico nei confronti di Rondine e Topino. Dalla Rondine rossiccia vedi pag. precedente. **Alimentazione:** insetti aerei catturati in volo. **Riproduzione:** coloniale. **Nido:** semicoppa di fango (con poca paglia e piume) tutto chiuso eccetto un foro nella parte sup.. Costruito di solito sotto i cornicioni delle case. **Lova e incubazione:** mag.-giu., entrambi i partner covano per 14-16 gg. 3-5 uova bianche. **Pulcini:** giu.-lug., nidicoli; alimentati dai genitori. **Distribuzione e migrazioni:** in tutta l'Europa. Migratore, sverna in Africa. **Voce:** un cinguettante «crrrip» di contatto o uno «tsiip» per allarme.

Primo avvistamento:  Data:   
Località:

gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic.

**Habitat:** villaggi e paesi con spazi agricoli e specchi d'acqua limitrofi. Anche zone montagnose e costiere. Meno campagnolo della Rondine, è presente anche in centri urbani molto antropizzati.

**RONDINE MONTANA**  
(*Phyonoprogne rupestris*) Crag Martin

Considerato il suo habitat, non potrebbe esservi nome più appropriato.

**Identificazione.** Lunghezza: 14 cm, più grande del Topino e del Balestruccio; apertura alare: fino a 34 cm. Occhi: marrone scuri. Becco: nero. Tarsi e piedi: marrone chiari. Sessi: simili. **Marone grigiastro sup.** Inf. chiaro ma non bianco come il Topino e il Balestruccio. Gola, petto e ventre omogenei senza alcuna banda. Coda poco forcuta quasi squadrata con macchioline bianche caratteristiche visibili soltanto a coda spiegata. **Giovane:** simile all'adulto ma più rossiccio. **In volo e confusioni:** volo agile più impetuoso e acrobatico rispetto alle altre rondini; può fare lo «spirito santo». Inf. copritrici più scure delle remiganti e delle altre parti inferiori. Dal Topino: più massiccio con assenza di banda sul petto, ali e coda più larghe, parti inf. meno chiare e meno contrastanti con le parti sup., puntini bianchi sulla coda. **Alimentazione:** insetti catturati in volo. **Riproduzione:** coloniale. **Nido:** semicoppa di fango riempita di piume e materiale vegetale e appesa a pareti e in cavità rocciose. **Lova e incubazione:** mag.-lug., principalmente la ♀ cova per 13-17 gg. 3-5 uova bianche. **Pulcini:** giu.-ago., nidicoli; alimentati dai genitori. **Distribuzione e migrazioni:** Europa del sud. Le popolazioni più settentrionali migrano parzialmente e svermano nel sud europeo o in nord Africa. Residenti le popolazioni più meridionali. **Voce:** un «prrit» o «crrri» di contatto.

Primo avvistamento:  Data:   
Località:

gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic.

**Habitat:** ambienti montani con pareti di roccia e pascoli d'alta quota (fino a 2.000 m circa), valloni, orridi. Anche coste marine rocciose.