


Diagnóstico da SIC



Para diagnosticar a síndrome do intestino curto, inicialmente é realizado um exame físico, é tido em conta o histórico familiar e os sintomas, posteriormente podem ser realizados alguns exames como exames de sangue, exame de amostras fecais para medir os níveis de nutrientes, raio-X com material de contraste, radiografia abdominal simples para detetar sinais de obstrução ou paralisia dos músculos intestinais, tomografia computadorizada , ressonância magnética do abdómen e teste de densidade óssea. Podem ser realizados testes adicionais para detetar ou avaliar possíveis complicações da síndrome do intestino curto. Estudos endoscópicos superiores e inferiores também podem auxiliar na avaliação da função do intestino remanescente.

Referências Bibliográficas:

Short bowel syndrome - Diagnosis and treatment - Mayo Clinic. (2018). MayoClinic.org.
<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/short-bowel-syndrome/diagnosis-treatment/drc-20450377>

DiLonardo, M. J. (2021, March 18). *Short Bowel Syndrome: Symptoms, Diagnosis, and Treatment.* WebMD. <https://www.webmd.com/ibd-crohns-disease/crohns-disease/short-bowel-syndrome#091e9c5e80f9a90e-1-5>